

Analysis 3 - Exercise Sheet 10

Publication date: Dezember 14, 2022

Due date: January 11, 2022

Wie besprochen, die zwei letzten Beispiele vom 8. Übungszettel noch mal.

Exercise 10.1 (20 pts) Sei $M = f^{-1}(0)$ eine erklpf im \mathbb{R}^2 mit der Dimension 1, wobei $f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion mit 0 als regulärem Wert ist (d.h., $Df(x)$ hat vollen rang für alle x mit $f(x) = 0$) und $(0, 0) \notin M$. Zeige, dass

$$R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0\}$$

eine 2-dimensionale erklpf des \mathbb{R}^3 ist. Veranschauliche dieses Resultat am Beispiel eines Torus.

Exercise 10.2 (20 pts) Sind die folgenden Mengen erklpf? Begründen Sie Ihre Antworten.

- Die Ebene als Teilmenge des \mathbb{R}^3 .
- Die Sphäre S^n als Teilmenge des \mathbb{R}^{n+1} .
- Die n-dimensionale Sphäre als Teilmenge des \mathbb{R}^m für $m > n+1$, das heißt, $S = \{x \in \mathbb{R}^m \mid (x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n\}$.
- Die linke Menge in Figure 1 im \mathbb{R}^2 .
- Die rechte Menge in Figure 1 im \mathbb{R}^2 .



Figure 1: Erklpf?

Exercise 10.3 (20 pts) Sei $N = (0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ und definiere

$$\iota_N : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad \iota_N(x) = N + \frac{2}{\|x - N\|_2^2}(x - N)$$

und die stereographische Projektion

$$\sigma_N : \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{N\}, \quad \sigma_N(x) = \iota_N(x, 0)$$

mit der n-dimensionalen Einheitssphäre $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Zeigen Sie, dass σ_N eine Parametrisierung von $S^n \setminus \{N\}$ ist. Fertigen Sie Skizzen für $n=1,2$ an. Das heißt:

- Zeigen Sie, dass σ_N surjektiv ist. Fertigen Sie eine Skizze an, um zu sehen, wie sie für $y \in S^n$ das passende x finden, sodass $\sigma_N(x) = y$.
- Zeigen Sie, dass σ_N injektiv ist.
- Zeigen Sie, dass die Jacobimatrix von σ_N injektiv ist. Die Jacobimatrix kann recht schön vereinfacht werden.



Exercise 10.4 (20 pts) Bestimmen Sie die Tangentialräume von $S^n \setminus \{N\}$ mithilfe der Parametrisierung aus 10.3.

Exercise 10.5 (20 pts) Sei die Hyperfläche $S \subset \mathbb{R}^3$ der Graph einer Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Erstellen Sie eine Gleichung für die Punkte (x, y, z) der Tangentialebene in $(x_0, y_0, z_0) \in S$ mittels der partiellen Ableitungen von g .